


MAPA PÉČE: GASTRICKÝ SLEEVE (TUBULIZACE ŽALUDKU)

AMBULANTNĚ	1. den hospitalizace PŘIJETÍ	2. den hospitalizace 0. OP den	3. den hospitalizace 1. POOP den	4. den hospitalizace 2. POOP den	Následující režim PROPUŠTĚNÍ
Průběh hospitalizace AMBULANCE (obezitol., bariatrická)	STANDARD.CHIR.ODD. příjem dopoledne	STANDARD./ MDJIP před OP / po OP	STANDARD.CHIR.ODD. (překlad z MDJIP)	STANDARD.CHIR.ODD.	PROPUŠTĚNÍ 5. POOP DEN PN 14-21 DNÍ
VYŠETŘENÍ: AMB. požadovaná: obezitologické bariatrické interní předoperační endokrinologické psychologické gastrofibroskopické	předložení komplexního předoperačního vyš. (rtg plic, EKG, laborat. vyšetření krve a moči) CHIRURGICKÉ vyš., ANESTEZIOLOG. vyš., Glykemie dlp.	KO dle potř. Glykemie dlp.	kontrola krev. souboru (KO, urea, krea, ionty, bilir., ALT, AST, S-amyl., glykemie dlp.-u DM 3x/D) NUTRIČNÍ TERAPEUT (konzultace) RTG PASÁŽ ŽALUDKU	kontrola Glyk. dlp.	OBEZITOL. KONTROLA (po 14 dnech) CHIRUR. KONTROLA (po 14 dnech, 6 týdnech, po 3-6-9-12 měs. -2 roky)
FF: (TK, TT, P, D) stabilizovány	TK při přijetí + dlp. TT při přijetí + dlp.	ráno před OP: TK, TT, po OP: FF, sat. O2, EKG, co 1/2-2 hod., do stabiliz. dále co 2-4 hod. TT/3x denně, EKG mon.	TK, PTT 3x denně (dlp.)	TT 3x denně TK dlp.	
OPERAČNÍ RÁNA intaktní kůže	očista OP pole oholení OP pole	sterilní krytí (Mepore) sledování prosáknutí	dlp. převaz	převaz rány	stehy ex CHIR-AMB po 14 dnech
DRENÁŽ		drén z lev.hypochondria rukavicev drén z rány	rukavicev drén EX	drén EX 2.-4 poop.den	
BOLEST absebce bolesti		PREMEDIKACE po OP - individuální analgetizace dle VAS	analgetika p.o.individ. (Novalgin tbl. dlp.)	absence bolesti (dlp.analgetika p.o.)	
OSTAT. MEDIKACE individuální p.o	individuální p.o	nic p.o - tbl. EX Fraxiparin 0,4 2xD s.c. DM - inzulinoterapie	individuální p.o. Fraxiparin 0,4 2xD s.c		
INFUZE		krystaloidní roztoky i. v (Ringer, Gl 5%) do tolerance p.o.příjmu u DM GI10%+INZ			
PERORÁLNÍ PŘÍJEM stabilizovány	běžná strava od půlnoci nejíst, nepít, nekořit	NIC PO - před OP po OP - po 4 - 6 hod. ČAJ po lžičkách	TEKUTINY (v malých dávkách <100 ml + častých intervalech)	TEKUTINY (v malých dávkách <100 ml + častých intervalech)	TEKUTÁ STRAVA (3-4 týdny) KAŠOVITÁ STRAVA (násled.2 týdny) BĚŽNÁ DIET.STRAVA
VYPRAZDNOV. MOČI v normě	spontánní	na lůžku do 8hod.po OP spontánní vymočení (cévkování)	vyprazdňování na WC s dopomocí	WC	
STŘEVNÍ PERISTALT. normální	normální	pooperační sledování restituce střev.peristal.	obnova střevní peristalt.	odchod stolice (popř.podpůrná laxantia)	
POHYBOVÝ REŽIM normální	bez omezení	po OP upoutání na lůž. polohování večer posazení na lůžku	VSTÁVÁNÍ z lůžka CHŮZE s dopomocí	CHŮZE	vhodná fyzická aktivita (pravidelná CHŮZE !!!!) popř.plavání, cyklistika
HYGIENICKÁ PÉČE	celková koupel oholení OP pole	bandáže DK dez. tampon do pupku	hygiena u umyvadla s dopomocí	samostatná hygiena v koupelně	
INFORMACE z AMB. - EDUKACE internet, kluby, časopisy, TV, noviny	INFORMOVANÝ SOUHLAS	příp.zodpovězení dotazů vyjasnění nejasností	EDUKACE: BARIATREM NUTRIČNÍM TERAP. prim. ZS (edukač. mater.)	opakovaná EDUKACE zodpovězení dotazů kontrol. dotazy	opak. EDUKACE při AMB. kontrolách, kontrol.dotazy



copyright©
Dita Koksová
gradiko.cz