

REKTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ



■ CO MOHU OČEKÁVAT, KDYŽ JDU NA REKTOSKOPICKÉ VYŠETŘENÍ?

Pokud máte předepsané rektoskopické vyšetření, důvodem je podezření na onemocnění konečníku, které vyplývá z vašich potíží. Vyšetření slouží ke zhodnocení nálezu na sliznici, odběru biopsie (vzorku), ošetření krvácení či odstranění výrůstků, tzv. polypů.



■ JAK DLOUHO VYŠETŘENÍ TRVÁ?

Délka vyšetření je obvykle cca 5 - 10 minut. Jedná se o ambulantní vyšetření.



■ JAK SE MÁM NA VYŠETŘENÍ PŘIPRAVIT?

Vyšetření se většinou provádí bez předchozí přípravy, v některých případech je před vyšetřením indikován přípravek k vyprázdnění konečníku (tzv. Yal). V případě, že berete léky zvyšující krvácivé komplikace (Warfarin, Heparin, Anopyrin, Aspirin, Godasal apod.), informujte o nich, ale i o ostatních lécích, které užíváte, vašeho odesílajícího i vyšetřujícího lékaře.





■ JAK BUDE PROBÍHAT SAMOTNÝ VÝKON?

Zdravotní výkon bude probíhat takto: vyšetření není bolestivé, pouze může být mírně nepříjemné. V poloze vleče nebo na boku je zaveden endoskop do konečníku (rigidní trubice zavedená do konečníku asi do vzdálenosti 25 cm. Současně se do střeva vpravuje vzduch.



■ MÁM POČÍTAT S NĚJAKÝM OMEZENÍM?

Po rektoskopii nevznikají žádná omezení v obvyklém způsobu života ani v pracovní schopnosti. Důležité je také upozornění na možná rizika výkonu. Rektoskopické vyšetření je velmi vzácně provázeno komplikacemi (časné nebo pozdní krvácení, porušení stěny tlustého střeva). Riziko krvácivé komplikace zvyšují některé léky (Warfarin, Heparin, Anopyrin, Aspirin, Godasal). Ještě jednou tedy prosíme, informujte odesílajícího i vyšetřujícího lékaře o lécích, které užíváte.

NEPODCEŇUJTE PREVENCI!

■ A KDE NÁS NAJDETE?



GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE NEMOCNICE MĚLNÍK
pavilon W - přízemí, telefon: 315 639 224, www.nemocnice-melnik.cz